Primario

Dr. med. Graziano Ruggieri

Vice primario

Dr. med. Paolo Rossi

Riabilitazione neurologica

Dr. med. Paolo Rossi

Riabilitazione muscolo-scheletrica

Dr. med. Claudio Petrillo, capo servizio

Riabilitazione geriatrica

Dr. med. Graziano Ruggieri

Riabilitazione sorveglianza elevata

Dr. med. Paolo Rossi

Riabilitazione cardio-vascolare

Dr. med. Davide Girola

Centro Parkinson Svizzera italiana

Dr. med. Vittorio Biglio

Prof. Dr. med. Alain Kälin (NSI)

Memory clinic

Valutazione multidisciplinare e trattamento disturbi cognitivi

Dr. med. Graziano Ruggieri

Clinica diurna

Maurizio Zanni, capo reparto

Medici capi clinica

Dr. med. Vittorio Biglio

Dr. med. Silvia Calzoni

Dr. med. Daria Dinacci

Dr. med. Davide Girola

Dr. med. Giovanni Mazzucchelli

Dr. med. Corrado Olgiati

Area cure infermieristiche

Iginio Bassi, responsabile

Claudia Evers, vice responsabile

Area multidisciplinare di terapia

Luca Tonolla, responsabile

Capi reparto

Fisioterapia: Isabella Antonini

Neuropsicologia: Chantal Fasoletti

Logopedia: Yuri Gallo

Ergoterapia: Giulio Gramegna

Direzione

Sandro Foiada, M.A.

Egregio Signor
Dr. med. Ezio Walder
Contrada S. Marco 4h
6982 Agno

Brissago, 29.04.2021

RAPPORTO MEDICO PROVVISORIO

**Concerne: Mirko Achermann, nato il 05.04.1967,
domiciliato ad Agno**

Egregio Collega,

il paziente in epigrafe è stato degente nel nostro Centro di riabilitazione dal 15.04.2021 al 29.04.2021, data del rientro al domicilio su richiesta del paziente stesso (autodimissione).

Diagnosi riabilitativa principale

1. Riduzione dell'autonomia nelle attività di vita quotidiana, deficit di equilibrio e disturbo della deambulazione in contesto di tremore mioclonico ai quattro arti ed al capo di probabile origine parainfettiva su Dg.2:

- RM encefalo (24.03.2021): negativa per lesioni strutturali
- discreta efficacia della terapia con Keppra

Intrapreso trattamento con IVIg (Privigen 0.4 g/Kg/die: tot 120 g in 5 giorni) dal 9 al 13.4.2021.

Diagnosi secondarie / polimorbosità

2. Pregressa ARDS severa su polmonite bilaterale da SARS-CoV-2 variante N501Y con/su:
- ECMO V-V dal 31.01.2021 al 18.01.2021

- TC Torace (15.03.2021): quadro invariato rispetto alla precedente del 01.03.2021 con persistenza di piccoli infiltrati periferici bilateralmente; diffusa alterata attenuazione parenchimale come per verosimile malattia delle piccole vie aeree;
- Insufficienza respiratoria globale multifattoriale con necessità di supporto ventilatorio invasivo dal 31.01 al 23.03.2021;
- posa di tracheostomia percutanea il 11.02.21 con revisione il 12.02 e il 13.02.21;
- Broncoscopia il 12.02 e il 16.02.21
- miopatia da cure Intense
- VAP da E.Faecalis (11.02.2021) e pregressa batteriemia da K. Pneumoniae su VAP;
- delirium ipercinetico da CI

3. Miopatia da Cure Intense

4. Trombosi venosa profonda dell'AS sx (basilica, cefalica, succlavia) con/su:

- DOAC con Xarelto 20mg dal 30.03.21
- Doppler (30.03.21): trombosi coinvolgente v. basilica, cefalica e succlavia

5. Immunosoppressione acquisita su terapia steroidea altodosata con/su:

- attuale prednisone 50mg/die fino al 01.04.21 poi 0.5mg/Kg (30mg) per un mese (Dr.ssa Voinea OSG)

6. Leucemia mieloide cronica in trattamento

7. Pregressa coagulopatia di origine multifattoriale con anemia e piastrinopenia.

8. Deflessione timica reattiva

9. Malnutrizione multifattoriale

10. Ipokaliemia ed ipocalcemia probabilmente su iponutrizione

11. Pregressa sindrome dell'outlet toracico in seguito alla quale ha effettuato intervento di rimozione bilaterale della prima costa

N.B per maggiori dettagli si prega di fare riferimento alle lettere di dimissione redatte in ambito acuto

Stato funzionale prima del ricovero/evento indice

Prima del ricovero per ARDS da SARS-COV-2 autonomo in tutte le attività di vita quotidiana, basali e strumentali

Esame obiettivo e funzionale all'ingresso

Paziente 53enne, noto alla Clinica "Hildebrand" per una precedente degenza stazionaria (dal 31.03.2021 all'08.04.2021), proveniente dal Reparto di Neurologia dell'Ospedale "Civico" di Lugano dove è stato trasferito elettivamente in data 08.04.2021 per eseguire un ciclo di immunoglobuline per il trattamento del tremore mioclonico.

Paziente visitato supino a letto in condizione di riposo; vigile, collaborante ed adeguato alla visita, orientato spazio-temporalmente e circa la propria persona; tono timico apparentemente in asse ad una prima valutazione bedside. Su specifica domanda non lamenta dolore (VAS = 0). Facies ipomimica; bulbi oculari in asse, pupille isoampie isocicliche normoreagenti alla luce; non franche paresi della motilità oculare estrinseca, non nistagmo patologico, alcune saccadi intrusive, non opsoclono; campo visivo indenne alle prove manuali per confronto, non diplopia. Comprensione per ordini semplici e complessi integra, eloquio fluente, intellegibile; ipofonia e deficit di coordinazione pneumofonoarticolatoria; non evidenti turbe fasiche, prassiche o

mnestiche ad una valutazione bedside; ugola in asse, velo palatino sollevato simmetricamente; lingua normotrofica, in asse nel cavo orale, normosporta e mobile su tutti i piani non disagia per solidi e liquidi. Segni meningei assenti, flesso-estensione e rotazione del capo conservate. Minimo tremore di bassa ampiezza e frequenza rapida al labbro inferiore.

Arti superiori: Mingazzini I mantenuto a sinistra senza slivellamenti; presenza di tremore rapido posturale e cinetico alla mano con componente mioclonica; prova indice/naso eseguita correttamente; disdiadococinesia conservata; ipototonotrofismo diffuso; stenia conservata al testing segmentario. A destra paresi brachiale > prossimale con: ipotrofia del deltoide ed iniziale anteposizione scapolo-omerale

Ipotrofia della massa del deltoide di destra, con iniziale anteposizione della scapolo-omerale; al testing segmentario accenno in abduzione ed elevazione di spalla con compensi (MRC1+), MRC 3 in flesso/estensione di gomito, MRC4 in flessione/estensione di polso e dita; MRC4 interossei. Più evidente a destra il tremore attitudinale e cinetico con componente mioclonica più accentuata in frequenza. ROT presenti, ipovalidi e simmetrici. Scapola alata destra.

Arti inferiori: Mingazzini mantenuto bilateralmente con oscillazioni posizionali maggiori a sinistra, ipototonotrofismo diffuso; al testing segmentario all'arto inferiore destro flessori di anca MRC4, estensori ginocchio MRC4, dorsiflessione del piede e plantiflessione MRC4; a sinistra MRC4 - a carico dei flessori di anca ed estensori di ginocchio; MRC2 in flessione dorsale del piede e plantare. ROT diffusamente anelicitabili. RCP in flessione bilateralmente. Sensibilità: ipoestesia a calza bilateralmente senza prevalenza di lato. Tremore attitudinale e cinetico con componente mioclonica a bassa frequenza più evidente a destra.

Dal punto di vista funzionale il paziente presenta un buon controllo del tronco in posizione seduta, ma necessita di aiuto di un operatore per il passaggio supino/seduto e da seduto alla stazione eretta, che mantiene con appoggio anteriore e a base allargata per qualche minuto. Con appoggio anteriore alto deambula per qualche metro con rapida affaticabilità e piede cadente a sinistra. Possibile lo spostamento del carico a destra e a sinistra sul piano frontale e accenna alla posizione ad arto singolo, con elevato rischio di caduta in particolare a sinistra.

Il paziente necessita di un aiuto nelle attività di vita quotidiana collaborando allo svolgimento delle stesse. Doccia da seduto con preparazione dell'ambiente, aiuto nell'abbigliamento sia nella parte superiore che inferiore del corpo.

Continente bisfinterico, autonomo nella gestione della terapia farmacologica prescritta.

All'esame obiettivo generale al cuore toni ritmici, tachicardici (FC 100 bpm), pause libere; al torace MV aspro diffusamente, non segni di stasi o broncospasmo, torace ipoespanso e ipoespansibile. Addome piano, trattabile, non dolente né dolorabile alla palpazione superficiale e profonda, peristalsi presente, fegato all'arco, Murphy e Blumberg negativi; cute pallida, mucose ipoidratate, polsi periferici presenti, simmetrici, isosfigmici, non edemi declivi.

Progetto riabilitativo

Obiettivo riabilitativo principale all'ingresso:

Il progetto post-riabilitativo è stato finalizzato al rientro al domicilio, valutando la necessità di attivare degli aiuti formali.

Decorso clinico / riabilitativo:

La breve degenza stazionaria è stata priva di problematiche internistiche acute meritevoli di segnalazione. Una caduta accidentale in camera in data 22.04 al mattino (dinamica: il paziente ha caricato sull'arto inferiore sinistro, dove presenta deficit di dorsiflessione, cadendo con ricezione su ginocchio destro, dove ha riportato una piccola escoriazione; contusione al polso destro, escoriazione alla fronte) senza conseguenze clinicamente rilevanti.

È stato eseguito un ecocardiocolordoppler in data 20.04.2021 (Dr. med. D. Girola): Ventricolo sinistro di normali dimensioni endocavitarie e spessori parietali. Non alterazioni della cinesia segmentaria. EF conservata. Camere atriali di normali dimensioni. VCI non dilatata normocollassante all'inspirio. Pericardio indenne.

L'aspetto preponderante fin dai primi giorni è stata la scarsa tolleranza al ricovero stazionario, atteggiamento a tratti oppositivo con rifiuto di sottoporsi a prelievi ematici, manifestata in più occasioni con richiesta di dimissione anticipata che, dopo colloqui informativi con il paziente (e contatti telefonici con la moglie) al fine di poter offrire ancora un periodo adeguato di riabilitazione stazionaria, è stata infine accolta in data odierna.

E' stato avviato un programma riabilitativo comprendente:

- Fisioterapia (mobilizzazione e rinforzo cingolo scapolare destro, rieducazione posturale; miglioramento delle reazioni di equilibrio statiche e dinamiche; rieducazione alla stazione eretta ed al cammino con ausilio di girello 4 ruote per tempi progressivamente crescenti; istruzione alla percorrenza alla scale con supervisione)
- Ergoterapia (attività in condizioni statiche/dinamiche integrando gli arti superiori)
- Massoterapia decontratturante cervico toracica da seduto
- Logopedia (valutazione: orientato, eloquio normo-fluente, voce eufonica e ben udibile in tutti i contesti, articolazione precisa. Prassie bucco linguo facciali precise e simmetriche con comparsa di tremore a carico della lingua e, in minor parte, della labbra, soprattutto all'emiviso destro. Sospetto disturbo a carico dell'ATM di destra che il paziente stesso riconosce: riferisce comparsa di dolore (sopportabile) durante la masticazione (ad es. del pane) e di percepire "della sabbia" all'interno della mandibola (con il dito indica la zona del condilo di destra). Nei movimenti di apertura del cavo orale non si avvertono difficoltà di movimento ma comparsa di crepitii mentre la lateralizzazione a sinistra risulta più difficoltosa e si accompagna da crepitii. Soggettivamente non riferisce difficoltà a carico del linguaggio né limiti funzionali a livello sociale e lavorativo ad esse correlati.
- Neuropsicologia (con sostegno psicologico e stimolazione cognitiva: Il versante cognitivo - principalmente il rallentamento e l'attenzione sostenuta- risultano già nettamente migliorati rispetto alla precedente degenza; si osserva una deflessione del tono dell'umore reattiva alla situazione di malattia ed al proprio vissuto).

Esame obiettivo e clinico funzionale alla dimissione

Sostanzialmente invariato rispetto all'ingresso con miglioramento della componente tremorigena mioclonica (pressochè assente al capo in condizioni di riposo) agli arti di destra. Dal punto di vista funzionale il Sig. Achermann è autonomo nei passaggi posturali, nei transfer; deambula con ausilio di girello 4 ruote, gestito in autonomia, anche per 30-40 metri, ripetibili; ancora instabile l'equilibrio, con rischio di caduta specie nei cambi direzionali ed in presenza di plurimi stimoli distraenti. In setting fisioterapico appena iniziato il training della percorrenza delle scale, con stretta supervisione, a passo semplice nei due sensi di marcia e con necessità di appoggio al corrimano.

Score di performance	<u>Ingresso</u>	<u>Dimissione</u>
<u>FIM (Functional Independence Measure)</u>	17.04.2021	17.04.2021
FIM totale	54/126	54/126
K-FIM	28/35	28/35
PM-FIM	26/91	26/91

Grado d'inabilità lavorativa

Paziente inabile al 100% fino a rivalutazione del Medico Curante

Abilità alla guida

Il paziente è inabile alla guida fino al con rivalutazione a cura del Medico Curante

Aspetti sociali

Il Sig. Achermann rientra al domicilio con la figlia come concordato in data odierna con la moglie.

Prescrizione di protesi e/o ausili: dispone al domicilio di un girello 4 ruote

Prescrizioni cliniche ed appuntamenti accordati

Abbiamo discusso sia con il paziente che con la moglie, qualora il Sig Achermann volesse rivedere la propria posizione e beneficiare di una presa a carico riabilitativa neurologica multidisciplinare, le seguenti possibilità:

- Nuovo ricovero riabilitativo stazionario previa richiesta del Medico Curante oppure percorso in semistazionario (Clinica Diurna) con accesso 2 o 3 volte a settimana (comprendente 2 fisioterapie, ergoterapia, supporto psicologico) anche questo previa segnalazione del Curante (utile un contatto telefonico diretto 091 786 8699 – attuale lista di attesa per Clinica Diurna: metà maggio 2021).

Rilasciamo le prescrizioni per le prime 9 sedute di:

- Fisioterapia domiciliare
- Ergoterapia domiciliare

Utile anche proseguire un counselling psicologico.

ULTERIORE PROCEDERE

- Si consiglia di prestare attenzione a mantenere tempi di riposo adeguati tra un'attività e l'altra, in quanto la fatica peggiora la componente tremorigena mioclonica.
- Monitoraggio degli elettroliti (Na, K); valutare il proseguimento della terapia con Keppra
- Organizzare un appuntamento di rivalutazione neurologica c/o Ospedale Civico (Ambulatorio Disturbi del Movimento, Dr Galati/ Dr.ssa Dinacci)
- Controllo regolare (ogni 15 giorni) di emocromo con formula, LDH, AST, ALT, GGT, creatinina, azotemia, Na, K, PCR come da indicazione della Collega Ematologa Curante (Dr.ssa Bianchi); procedere poi con gli appuntamenti accordati per il follow-up del quadro di leucemia mieloide cronica, attualmente in terapia con Imatinib
- Indicazioni Dr.ssa Di Benedetto (Infettivologa; Segretariato (0)91 811 60 22; mail Malattie.infettive@eoc.ch): attendere, prima di considerare la vaccinazione anti-COVID19, che il paziente abbia eseguito un significativo décalage della terapia steroidea (attualmente paziente immunodepresso); per la tempistica ci si affida ai colleghi Pneumologi. Dal punto di vista infettivologico, data la fragilità e il quadro di immunodepressione, opportuna, nonostante la precedente infezione da coronavirus, duplice somministrazione di vaccino anti-COVID a mRNA.
- Indicazioni Dr.ssa Voinea (Pneumologa): Sono confermate le tempistiche di tapering steroideo riportate nella lettera del CCT; dal 1 maggio si passerà a 20 mg/die; il decalage dovrà rispettare i tempi previsti ed essere eseguito con la massima cautela per ridurre il rischio di flair della fibrosi polmonare, particolarmente elevato nei pazienti in esiti di malattia da SARS CoV-2; il paziente è stato segnalato per visita pneumologica a Lugano al Dr. Valenti; se possibile scendere sotto i 20 mg/die di steroide si potrà considerare, da metà giugno la vaccinazione COVID in duplice somministrazione con vaccino a mRNA. Il paziente è stato segnalato per prossimità, in vista di una presa in carico di lungo periodo, al Dr Valenti
- Appuntamento per Spirometria e Test del cammino il 25.05.2021 ore 13 presso amb. Pneumologia 4°p Osp Civico dopo aver ritirato le etichette al pian terreno

- Visita Pneumologica con Dr Valenti (Caposervizio Pneumologia Osp. Civico; (0)91 811 63 55 (sede OCL)) il 26.05.2021 alle ore 10

Restando a sua completa disposizione per ogni informazione, porgiamo collegiali saluti.

----- INIZIO CAMPI FIRMA -----

Dr. med Valentine Barbieri
MEDICO ASSISTENTE

----- FINE CAMPI FIRMA -----

Allegati:

- Terapia farmacologica
- Risultati laboratorio
- Referto degli esami cardiologici

C.p.c.:

- Segretariato Medico Neurocentro OCL.

ESAMI EMATOCHIMICI
67925 - Mirko Achermann, 05.04.1967 - Camera: 204/2

19.04.21 PB

Prelievo	Data		19.07.21						
	Ora		07:30						
	venoso / capillare		☒ v ☐ c	☐ v ☐ c					
Sedimentazione	mm/H	3-11							
Glucosio	mmol/L	4-6							
Urea	mmol/L	2.9 - 8.2	4.9						
Creatinina	μmol/L	M 53 - 97	-36						
		F 35 - 80							
GFR (formula CKD-EPI)	ml/min/1.73m ²	>90	134						
Hb glicosilata HbA1c		4,5 - 6,3 %							
Acido urico	μmol/L	M 208 - 416							
		F 149 - 357							
Colesterolo	mmol/L	3,88 - 5,66							
HDL-Colesterolo	mmol/L	M 0,93 - 1,55							
		F 1,16 - 1,78							
Trigliceridi	mmol/L	0,56 - 1,68							
LDL calcolato	mmol/L	≤ 3,00							
Proteine totali	g/L	67 - 83							
Albumina	g/L	38 - 50							
Bilirubina totale	μmol/L	2,0 - 21,0							
LDH	U/L	106 - 211	168						
CK	U/L	M 40 - 200							
		F 30 - 150							
CK-MB	U/L	< 25							
ASAT (GOT)	U/L	8 - 38	20						
ALAT (GPT)	U/L	4 - 44	13						
gamma-GT	U/L	16 - 73	22						
Fosfatasi alcalina	U/L	38 - 126							
Amilasi totale	U/L	37 - 125							
Sodio	mmol/L	136 - 149	139						
Potassio	mmol/L	3,5 - 5,0	3,6						
Cloro	mmol/L	98 - 106							
Calcio	mmol/L	2,10 - 2,60							
Fosfato	mmol/L	0,84 - 1,42							
Troponin-I	ng/mL	< 0,05							
NT-proBNP	ng/L	< 300							
Proteina C-reatt.	mg/L	< 5	<5						
Procalcitonina	ng/mL	< 0,50							
Valore comunicato al medico	Data:								
	Ora:								

Commento:

Signor
 Mirko ACHERMANN
 6982 Agno
 05.04.1967 / 204/2

ESAMI EMATOLOGICI

Prelievo		Data / ora	19.04.21 / 07:30				
		venoso / capillare	V ■ / C □	V □ / C □	V □ / C □	V □ / C □	V □ / C □
Emogramma	Hb ♂ >140 / ♀ >120	g/L	-103				
	Eritrociti	>4.00 10E12/L	-3.30				
	Hct ♂ >0.40 / ♀ >0.35	L/L	-0.31				
	MCV	80-100 fl	93				
	MCH	26-34 pg	31				
	MCHC	310-360 g/L	335				
	Trombociti	150-400 10E9/L	160				
	Leucociti	4.0-10.0 10E9/L	-3.2				
	Reticolociti	15-25 0/00					
Cellule mature	Neutrofilii bastoncini segmentati	% 45.0 - 70.0	48.6				
	Eosinofili	% 1.0 - 5.0	-0.3				
	Basofili	% 0.0 - 0.5	0.5				
	Monociti	% 3.0 - 10.0	8.2				
	Linfociti	% 20.0 - 40.0	+42.4				
	Neutrofilii #	10E9/L 1.00 - 8.60	1.58				
	Eosinofili #	10E9/L <0.70	0.01				
	Basofili #	10E9/L <0.15	0.02				
	Monociti #	10E9/L 0.20 - 0.95	0.26				
	Linfociti #	10E9/L 1.50 - 4.00	-1.37				
Cell. immature	Blasti	%					
	Promielociti	%					
	Mielociti	%					
	Metamielociti	%					
Neutrofilii	Nucleo	picnosi					
	Plasma	inclusioni basofile					
		vacuoli					
	Granula	fine					
Monociti		media					
		grossa					
	Nucleo	lobati / non lobati					
	Plasma	vacuoli					
Linfociti	Granula	fine					
		grossa					
	Nucleo	giovani					
Trombociti		maturi					
	Plasma	basofilo					
		chiaro					
		anisocitosi					
Eritrociti		ipogranulati					
		giganti					
		Anisocitosi					
		Microcitosi					
		Macrocitosi					
		Poichilocitosi					
		Policromasia					
		Ipocromia					
		Cellule Target					
		Stomatociti					
Coagulazione		Ovalociti					
		Acantociti					
	Quick/INR	70 - 130%					
		terapia 20 - 40%					
	D-Dimeri	<=400 ng/ml					
	PTT	secondi 26 -32					
Valore comunicato al medico	Data						
	Ora

Signor
Mirko ACHERMANN
6982 Agno
05.04.1967 / 204/2

ESAMI EMATOLOGICI

Prelievo		Data / ora	19.04.21 / 07:30					
		venoso / capillare	V ■ / C. □	V □ / C. □	V □ / C. □	V □ / C. □	V □ / C. □	V □ / C. □
Emogramma	Hb ♂ >140 / ♀ >120	g/L		-103				
	Eritrociti	>4.00 10E12/L		-3.30				
	Hct ♂ >0.40 / ♀ >0.35	L/L		-0.31				
	MCV	80-100 fl		93				
	MCH	26-34 pg		31				
	MCHC	310-360 g/L		335				
	Trombociti	150-400 10E9/L		160				
	Leucociti	4.0-10.0 10E9/L		-3.2				
	Reticolociti	15-25 0/00						
Cellule mature	Neutrofili	bastoncini segmentati	% 45.0 - 70.0	48.6				
	Eosinofili		% 1.0 - 5.0	-0.3				
	Basofili		% 0.0 - 0.5	0.5				
	Monociti		% 3.0 - 10.0	8.2				
	Linfociti		% 20.0 - 40.0	+42.4				
	Neutrofili #	10E9/L	1.00 - 8.60	1.58				
	Eosinofili #	10E9/L	<0.70	0.01				
	Basofili #	10E9/L	<0.15	0.02				
Monociti #	10E9/L	0.20 - 0.95	0.26					
Linfociti #	10E9/L	1.50 - 4.00	-1.37					
Cell. immatur	Blasti	%						
	Promielociti	%						
	Mielociti	%						
	Metamielociti	%						
Neutrofili	Nucleo	picnosi						
	Plasma	inclusioni basofile						
		vacuoli						
	Granula	fine						
	media							
	grossa							
Monociti	Nucleo	lobati / non lobati						
	Plasma	vacuoli						
	Granula	fine						
	grossa							
Linfociti	Nucleo	giovani						
		maturi						
Trombociti	Plasma	basofilo						
		chiaro						
		anisocitosi						
Eritrociti		ipogranulati						
		giganti						
		Anisocitosi						
		Microcitosi						
		Macroцитоси						
		Poichilocitosi						
		Policromasia						
		Ipocromia						
		Cellule Target						
		Stomatociti						
	Ovalociti							
	Acantociti							
Coagulazione	Quick/INR	70 - 130%						
		terapia	20 - 40%					
	D-Dimeri	<=400 ng/ml						
	PTT	secondi 26 -32						
Valore comunicato al medico	Data							
	Ora							

ACHERMANN, Mirko

ID:

16-Apr-2021

14:43:48

Clinica Hildebrand

5-Apr-1967
Maschile

Camera: 204.2

Frequenza 94 bpm
Intervallo PR 116 ms
Durata QRS 78 ms
QT/QTc 346/432 ms
Assi P-R-T 41 46 34

Ritmo sinusale normale
ECG normale

scandito
16 Apr 2021 14:48

Non confermato

REFERTO ECOCARDIOCOLORDOPPLER

Brissago, 20.04.2021/bg

Achermann, Mirko, 05.04.1967, Agno/ 723118, 67925

Esame del 20.04.2021
Ecografo: Mindray DC-70 Exp

Altezza: 173.00cm **Peso:** 63.00kg **BSA:** 1.75m²

Misure 2D

LV

IVSd:1.15cm

LVPWd:0.69cm

LV Mass(Cube):162g

Teichholz

EDV(Teich):96.89ml

Aorta & Aortic Valve

LA/Ao(2D)

Diam Ao:3.35cm

LVIDd:4.59cm

IVSd/LVPWd:1.68

LV Mass-I(Cube):92.68

EDV Index(Teich):55.28

Conclusione

Ventricolo sinistro di normali dimensioni endocavitare e spessori parietali.

Non alterazioni della cinesi segmentaria.

EF conservata.

Camere atriali di normali dimensioni.

VCI non dilatata normocollassante all'inspirio.

Pericardio indenne.

Achermann, Mirko, 05.04.1967, Agno/ 723118, 67925

Immagini ultrasuono